



09.03.2016

*Comunicat de presă*

***Acțiune locală pentru alerta globală la virusul Zika***

Până în prezent în județul Bihor nu a fost semnalat nici un caz de infecție cu virusul Zika.

**Informații esențiale privind virusul Zika (ZICV)**

Infecția cu virus Zika este cauzată de un microorganism și este transmisă prin intermediul țânțarilor.

Perioada de incubație variază între 3 - 12 zile după înțepătura unui țânțar infectat.

Majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice (fără nici un semn, 60 - 80%).

Când se manifestă, simptomele bolii sunt de obicei ușoare, cu caracter autolimitant în 4 -7 zile, fără complicații severe sau decese asociate și cu o rată scăzută de spitalizare.

Principalele simptome sunt: erupția maculară sau papulară, febră, dureri articulare, conjunctivită, dureri musculare, durere de cap. Erupția maculo-papulară de cele mai multe ori apare inițial pe față și apoi se extinde pe tot corpul.

Nu există tratament profilactic sau vaccin pentru a proteja împotriva infecției ZIKV. Prin urmare, se recomandă măsuri de prevenire cu caracter personal, pentru a evita înțepăturile de țânțar.

**I. Măsurile preventive pentru persoanele care călătoresc în țările afectate de virusul Zika**

Persoanele care călătoresc în țări cu transmitere locală a virusului Zika (ZIKV) trebuie să fie informate asupra riscului de infecție cu acest virus. Focare epidemice sunt în desfășurare în Mexic, țări din zona Caraibelor și America de Sud.

Persoanele care călătoresc în aceste țări este necesar să aplice măsuri de protecție personală în vederea protecției împotriva înțepăturii de țânțari, atât în incinte, cât și în exterior, mai ales de la răsăritul soarelui până la apus, când este intervalul maxim de activitate al țânțarului vector.

- Este indicată folosirea de substanțe repelente în concordanță cu instrucțiunile de pe eticheta produsului. Substanța *N,N*-Diethyl-*meta*-toluamide (DEET) nu este recomandată pentru copiii cu vârsta sub 3 luni, dar femeile însărcinate o pot folosi;
- Purtarea de pantaloni lungi și bluze/cămași cu mânecă lungă, mai ales în perioada de maximă activitate a țânțarului vector;
- În încăperile pentru repaus/somn să existe aer condiționat sau mijloace de protecție mecanică sau să se folosească plase de pat pentru țânțari, chiar și în timpul zilei.
- Femeile care își doresc o sarcină în perioada următoare, gravidele, persoanele cu boli imune sau cronice severe, cele însoțite de copii mici, este necesar să consulte un medic sau să se adreseze unui cabinet specializat în medicina de călătorie înainte de a călători, pentru a primi recomandări privind folosirea repelentelor și alte măsuri preventive.
- Călătorii care prezintă simptome compatibile cu infecția cu virus Zika, în interval de 3 săptămâni de la întoarcerea dintr-o zonă afectată, sunt sfătuiți să se adreseze medicului și să specifice că au călătorit recent în acea zonă.
- Femeile însărcinate care au călătorit în zone cu transmitere a virusului Zika trebuie să specifice acest lucru cu ocazia consultului prenatal, astfel încât să fie evaluate și monitorizate corespunzător.

## **II. Cum pot contribui autoritățile locale la prevenirea infecției cu virusul Zika?**

Direcția de Sănătate Publică solicită autorităților administrației publice locale din Județul Bihor să își revizuiască, iar ulterior să aplice corespunzător, planul de combatere a țânțarilor astfel încât să se asigure spre utilizare și substanțele active pentru combaterea țânțarilor din specia *Aedes albopictus*.

Acțiunile de desțânțărire în zonele cunoscute a fi posibile locuri favorizante înmulțirii țânțarilor (terenuri virane, zona parcurilor, lacurilor etc., inclusiv depozite de anvelope), cât și în jurul spitalelor și secțiilor de boli infecțioase, în care există posibilitatea internării cazurilor suspecte de infecție Zika de import, vor fi desfășurate de prestatori de servicii autorizați, care vor utiliza obligatoriu substanțe avizate, înregistrate în Nomenclatorul național de substanțe biocide.

Menționăm că atribuțiile autorităților publice locale sunt stipulate în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014.

Cu stimă,

**Director executiv  
Dr. Rahotă Daniela**

**Director executiv adjunct sănătate publică  
Dr. Bîtea Zoia**