



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**Direcția de Sănătate Publică BIHOR**  
**Strada Libertății nr. 34, 410042-Oradea**  
**Tel. 0259-434565, 415521; Fax 0259-418654**  
**Internet: [www.dspbihor.gov.ro](http://www.dspbihor.gov.ro)**  
**e-mail : [relatiipublice@aspbihor.ro](mailto:relatiipublice@aspbihor.ro)**

---

24.07.2017

*Comunicat de presă*

*Aspecte esențiale privind prevenirea rujeolei*

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte contagioasă. Simptomele apar de obicei la 10-12 zile de la contactul cu virusul și la început pot fi confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse și febră mică. Pe măsură ce boala progresează și în special între a treia și a șaptea zi de la debut, temperatura crește până la 39-41°C iar pe corp apare o erupție caracteristică reprezentată de pete roșii care persistă de la 4 la 7 zile.

Rujeola duce deseori la complicații care pot afecta aproape orice organ, cum ar fi encefalita, pneumonia sau infecții ale urechii. Pot apărea diareea severă și deshidratarea secundară, iar orbirea poate fi una din sechelele rujeolei.

Doar vaccinarea protejează copiii împotriva rujeolei (pojarului) și a complicațiilor sale. Pojarul este o boală gravă deoarece 30% dintre cazurile de rujeolă dezvoltă complicații: 1 din 4 persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital; 1 din 1000 bolnavi de pojar moare din cauza bolii. Vaccinul protejează și elimină riscul de a face forme severe ale bolii, complicații sau deces care pot apărea în momentul infectării. Cu cât numărul de copii vaccinați dintr-o comunitate se mărește riscul de îmbolnăvire pentru ceilalți copii din comunitatea respectivă e mai scăzut.

Cum se realizează vaccinarea?

Două doze de vaccin rujeolic (vaccin ROR care asigură imunitate împotriva a trei boli: rujeolă, oreon și rubeolă) protejează aproape 100% împotriva bolii și complicațiilor potențial severe ale acesteia sau care pot duce la deces. Orice copil are dreptul să primească prima doză de vaccin atunci când împlinește 1 an iar pe cea de-a doua la vârsta de 5 ani. Datorită numărului mare de cazuri de pojar diagnosticate în România în ultima perioadă s-a introdus o doză de vaccin după ce copilul împlinește vârsta de 9 luni.

În condițiile în care 9 din 10 părinți își vaccinează copiii previn riscul unor boli infecțioase majore care în secolele trecute au produs decese la nivel global. În România vaccinarea este gratuită și se realizează conform Calendarului Național de Imunizări. Din fonduri publice Ministerul Sănătății asigură achiziționarea vaccinurilor iar prin distribuția realizată de Direcția de Sănătate Publică Județeană vaccinul ajunge în teritoriu, cu respectarea lanțului de frig, la medicii de familie cărora le este plătită activitatea de vaccinare efectuată.

Pentru a proteja sănătatea și pentru ca grija față de copil să fie completă, părinții copiilor trebuie să se adreseze la cabinetul medicului de familie pentru a administra copilului, gratuit, vaccinul ROR la vârstele de 9 luni, 1 an și 5 ani.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. DANIELA RAHOTĂ