



26.07.2018

Comunicat de presă

Cum să prevenim îmbolnăvirile cu virusul West Nile?

În conformitate cu precizările Institutului Național de Sănătate Publică, în unele țări europene au fost notificate cazuri de infecție cu virusul West Nile, astfel:

-până la data de 19.07.2018 au fost confirmate 19 cazuri de infecție cu virus West Nile în țări ale Uniunii Europene: **Grecia (12), Italia (4), România (2) și Ungaria (1)**, precum și a 29 cazuri în Serbia în județe din Banatul de vest la granița cu România;

-confirmarea în România, în intervalul 2.05.-24.07.2018, a 5 cazuri de meningo-encefalită cu virus West Nile (Dolj – 2 cazuri, Brăila, Iași și Olt – câte un caz) în două regiuni diferite ale țării.

Situația meteorologică actuală din România este propice dezvoltării vectorilor: ploi urmate de perioade de încălzire precum și inundații în unele zone din țară.

În județul Bihor nu există cazuri sau suspiciuni de infecție cu virusul West Nile, totuși este necesară aplicarea măsurilor de prevenire a infecției.

La nivel comunitar autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii trebuie să aplice ferm și eficace **măsurile pentru combaterea și controlul populației de țânțari din zone cu lacuri, bălți și zone cu risc (în zonele rurale) și asanarea subsolurilor inundate, dezinsecția zonelor cu parcuri și spații verzi, în localitățile urbane.**

La nivel individual, fiecare cetățean trebuie să prevină infectarea cu virusul West Nile prin protecția împotriva înțepăturilor de țânțari prin:

- **evitarea expunerii la țânțari**, mai ales în aer liber în amurg și în zori când țânțarii sunt mai activi, prin purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi,
- **utilizarea substanțelor chimice care resping țânțarii** (aplicate cutanat și/sau ambiental),
- **împiedicarea pătrunderii țânțarilor în locuință** (prin montarea de site la ferestre, uși),
- **desecarea bălților de apă** din jurul gospodăriilor și **îndepărtarea recipientelor cu apă stătută** (butoaie cu apă, vase, vase cu flori, etc., care permit înmulțirea țânțarilor). Se va schimba des apa din vasele pentru adăpatul animalelor, evitându-se stagnarea acesteia.

Mai multe informații privind infecția cu virusul West Nile sunt prezentate în caseta următoare.

Simptomatologia și transmiterea infecției cu virusul West Nile

Virusul West Nile afectează sistemul nervos central.

- 80% din persoanele infectate nu prezintă nici un fel de simptome.
- 20% au simptome ușoare: febră, cefalee, grețuri, vărsături, erupție cutanată, inflamarea ganglionilor.
- Numai 1 din 150 persoane pot dezvolta forma severă a bolii cu febră mare, cefalee, dezorientare, meningită până la comă.
- Sunt afectați mai ales copiii, vârstnicii cu rezistență scăzută.

Virusul este transmis prin mușcătura țânțarilor infectați. Infecția nu se transmite prin atingerea unei persoane infectate.

Cea mai eficientă metodă de prevenire este evitarea înțepăturilor de țânțari.

La apariția simptomelor de boală, pacienții trebuie să se adreseze medicului, evitând să se trateze singuri.

Director Executiv

Dr. Daniela Rahotă