



Nr. 19261

02.12.2019

### ***Comunicat de presă***

În fiecare an, la începutul lunii decembrie, celebrăm Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA. În acest an, campania se derulează sub sloganul: "Comunitățile fac diferența".

Obiectivul campaniei este de a informa populația generală și grupurile cu risc crescut cu privire la modalitățile de transmitere și prevenire a infecției HIV/SIDA și la importanța consilierii, testării și tratamentului (în cazul persoanelor seropozitive).

HIV este virusul care provoacă SIDA.

Infecția HIV/SIDA se poate transmite prin:

- \* contact sexual neprotejat cu o persoană infectată cu HIV;
- \* de la o mamă infectată la copilul ei în timpul sarcinii, nașterii sau alăptării;
- \* sânge, prin instrumente medicale și nemedicale contaminate cu sânge infectat.

Diagnosticul în infecția HIV/SIDA poate fi pus doar prin teste specifice de laborator.

Diagnosticarea timpurie a infecției cu HIV înseamnă o reacție mai bună la tratament, o viață mai lungă, cu o calitate mai bună a persoanei infectate. Inceperea tratamentului poate reduce rata de transmitere a infecției la alte persoane.

**Testează-te! Viața ta are prioritate!!!**

Persoana infectată transmite infecția HIV/SIDA încă din momentul infectării sale, nu al diagnosticării. În acest sens, anumite grupuri populaționale considerate la risc, au obligativitatea testării HIV:

\* gravide;

\* persoane cu anumite condiții/afecțiuni (tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, unele tulburări mintale, donatori de sânge, personal medico-sanitar, hemodializați, transfuzați, nou-născuți din mame seropozitive, contacți ai persoanelor infectate cu HIV, persoane cu parteneri sexuali multipli, victime ale violului sau abuzurilor sexuale, șoferi de transport internațional, marinari de cursă lungă, persoane cu sejur de peste 6 luni în străinătate, persoane care au lucrat mai mult de 6 luni în străinătate, persoane care urmează să se căsătorească, personalul aflat în misiune în străinătate, imigranții și refugiații);

\* bărbați care fac sex cu bărbați, persoane care practică sexul comercial, consumatori de droguri injectabile, persoane private de libertate; (grupuri CU RISC CRESCUT)



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR**  
**Strada Libertății nr. 34, 410042-Oradea**  
**Tel. 0259434565, 0259415521; Fax 0259418654**  
**Pagină web: [www.dspbihor.gov.ro](http://www.dspbihor.gov.ro)**  
**E-mail: [secretariat@dspbihor.gov.ro](mailto:secretariat@dspbihor.gov.ro)**

---

La Direcția de Sănătate Publică Bihor, testarea HIV se poate efectua gratuit.

Ar trebui să învățăm să evităm, să condamnăm și să ne opunem hărțuirii sexuale și violenței.

Nici un copil sau adult care trăiește cu HIV nu ar trebui să fie vreodată stigmatizat sau discriminat.

În 2018, la nivel mondial, 37.9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 36,2 milioane adulți și 1,7 milioane copii. 79% dintre persoanele infectate știau că au HIV/SIDA.

În 2018 au existat 1,7 milioane noi infecții HIV (dintre care 1,6 milioane adulți și 160.000 copii sub 15 ani), iar 23,3 milioane persoane au primit terapie antiretrovirală. 770.000 de persoane au decedat datorită bolilor asociate cu SIDA.

510.000 de tineri cu vârste între 10 și 24 de ani au fost recent infectați cu HIV, dintre care 190.000 au fost adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani.

În Europa de Est și Centrală, prevalența HIV este în creștere în mare parte din cauza nivelurilor ridicate de consum de droguri injectabile nesigure. 4 din 5 persoane care trăiesc cu HIV în țările din această regiune au vârsta sub 30 de ani, iar 1 din fiecare 3 noi infecții apare la tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.

În România, conform OMS, în iulie 2018, existau 15.661 persoane infectate cu HIV.

La 31 decembrie 2018 au fost raportate 7.786 cazuri HIV și 16.106 cazuri SIDA; 188 cazuri cu vârste sub 15 ani și 15.322 cu vârste peste 20 ani; 12.862 cazuri au primit tratament, numărul cazurilor noi de HIV/SIDA a scăzut față de 2010 (respectiv de la 730, la 691), 80 cazuri SIDA aflându-se în evidență în județul Bihor.

**Director Executiv**  
**Dr. Daniela Rahotă**



# ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA


1 Decembrie 2019

## EUROPA, 2017

- **4** din **5** persoane cu HIV au **sub 30** de ani.
- **1** din **3** noi infecții apare la tinerii de **15 - 24** de ani.
- Tineri de **15 - 24 ani** care au infecția cu HIV:
  - **9** din **100** în Regiunea Europeană OMS
  - **11** din **100** în UE/EEA

## ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN


Cazuri noi/100 000 de HIV diagnosticate în România vs. UE / SEE 2008-2017



În România, în anul 2017 exista:

- **1** caz din **10** în UE/SEE transmise de la **mama la copil**
- **1** caz din **10** în UE/SEE transmise prin **injectarea de droguri**
- **1** caz din **20** în UE/SEE transmise prin **contact heterosexuale**
- **1** caz din **75** în UE/SEE transmise prin **sex între bărbați**

Proporția persoanelor diagnosticate cu SIDA și TB EU/EEA, 2017



## ROMÂNIA

**23892** Cazuri HIV/SIDA 1985-2018  
**16106** Cazuri SIDA 1985-2018  
**7786** Cazuri HIV 1992-2018  
**7483** Decese SIDA 1985-2018  
**691** Cazuri noi HIV/SIDA 2018


Distribuția cazurilor noi de infecție HIV/SIDA relevă:

- **3** din **4** cazuri apar la bărbați, în 1985-2018
- **3** din **5** cazuri apar la bărbați, în 2018


În perioada **1992-2018**, evoluția numărului de cazuri noi de HIV a fost la:

- **bărbați**
  - o **1597** cazuri la grupa de vârstă **20-29 ani**
  - o **1242** cazuri la grupa de vârstă **30-39 ani**
  - o **478** cazuri la grupa de vârstă și **40-49 ani**
- **femei,**
  - o **993** cazuri la grupa de vârstă **20-29 ani**
  - o **555** cazuri la grupa de vârstă **30-39 ani**

Distribuția pe genuri și vârste a cazurilor HIV, 1992-2017



Evoluția modalităților de transmitere HIV/SIDA, 2007-2018, România



• Virusul imunodeficienței umane (HIV) poate afecta pe oricine.

• Unele grupuri de persoane sunt afectate de HIV mai mult decât altele, dar HIV poate fi transmis oricui

## COMUNITĂȚILE FAC DIFERENȚA

Prevenire  
Educare  
Susținere



## INFECȚIA CU HIV POATE FI PREVENITĂ

- **Intervenții preventive:**
  - consiliere și testare HIV;
  - educație pentru prevenirea HIV;
  - terapia antiretrovirală anterioară;
- **Consilierea cuplului înainte de sarcină** (testarea și consilierea pentru HIV și infecții cu transmitere sexuală).
- **Profilaxia pre și post-expunere pentru partenerul HIV-negativ.**
- **Eliminarea sau reducerea riscului de infectare cu HIV prin contact sexual** (utilizarea corectă a prezervativului).
- **Tratamentul antiretroviral (ART).**
- **Reducerea riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri** (folosirea medicamentelor de substituție).



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE STĂRI DE SĂNĂTATE



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI