



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică BIHOR

Oradea, Str.Libertății nr.34
Tel. 0259-434565 , Fax 0259-418654
e-mail : secretariat@dspbihor.gov.ro ,
Pagină web: <http://www.dspbihor.gov.ro>

18.09.2020

Comunicat de presă

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de noul coronavirus SARS-CoV-2, începerea activității în unitățile de învățământ precum și numeroasele întrebări adresate de părinți și cadre didactice Direcției de Sănătate Publică Bihor și altor instituții publice, referitoare la testarea RT PCR, comunicăm persoanelor interesate, faptul că testarea gratuită se realizează doar în conformitate cu *Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)* (<https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1914-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-10-08-2020/file>):

criteriile pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2

Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:

1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar, conform definiției de caz;
2. Contacti apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate;
3. Pacienți cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici) și donatorii de organe, țesuturi și celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, țesuturi și celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant – 2 teste la 24 de ore interval;
4. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplasează de la centrul de transplant în centrele de prelevare – la fiecare 2 săptămâni;
5. Pacienți asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos, cu maximum 48 de ore înainte de internarea în spital; În acest context, termenul de imunosupresie se referă la: chemoterapia citotoxică, agenți biologici cu acțiune prelungită, imunoterapie celulară și doze mari de glucocorticoizi, conform ghidului Societății Americane de Boli Infecțioase (6.05.2020), accesat la <https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/>
6. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie:
 - Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – cu maximum 48 de ore înainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;
 - Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte de prima ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea curei;
7. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore înaintea intervenției/manoperei;

Notă: Cu referire la punctele 5., 6. și 7., în cazul pacienților copii care se internează cu însoțitor, se testează și însoțitorul.

8. Pacienți hemodializați asimptomatici - de 2 ori pe luna;
 - Pacienți hemodializați asimptomatici contactați cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de restul pacienților;
9. Pacienți hemodializați simptomatici;
10. Persoane instituționalizate asimptomatice – de 2 ori pe lună;
11. Personalul de îngrijire din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună;
12. Gravidele asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit simptomatice;
13. Personal medico-sanitar și auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.”

Confirmarea promptă a cazurilor suspecte este o prioritate și este necesară pentru implementarea măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, de aceea, persoanele simptomatice, copii sau adulți, care se încadrează în definiția de caz / caz suspect, vor beneficia de testare conform metodologiei.

Reamintim membrilor comunității, faptul că măsurile simple care sunt la îndemâna tuturor, în combaterea infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, sunt:

- conduita socială responsabilă, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare
- respectarea măsurilor de distanțare, evitarea locurilor aglomerate,
- respectarea normelor de igienă personală (igiena corectă a mâinilor, igiena respirației: tuse / strănut - în plica cotului sau în șervețel de unică folosință) și utilizarea substanțelor dezinfectante atunci când este necesar
- utilizarea corectă a măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, și îndepărtarea în siguranță a acestora, respectiv eliminarea lor cu responsabilitate și grijă față de mediul înconjurător,
- în cazul apariției de simptome asociate COVID-19 (tuse, strănut, rinoree, temperatură, dificultăți de respirație) este necesară contactarea medicului de familie sau, în cazul în care este necesar, apelarea serviciului de urgență 112 și evitarea expunerii altor persoane.

**Director executiv
Dr. Daniela Rahotă**