



07.02.2019

Comunicat de presă

Informații actualizate privind evoluția îmbolnăvirilor prin rujeolă în județul Bihor

În anul 2018 s-a înregistrat un număr de 147 cazuri de rujeolă.

De la începutul anului 2019 până în prezent, au fost înregistrate 83 cazuri de rujeolă (38 confirmate serologic, 33 probabile – prin link epidemiologic, 12 suspiciuni – ser trimis la Cluj). Din cele 83 cazuri, 66 cazuri s-au înregistrat la persoane nevaccinate deloc sau vaccinate incomplet (lipsește doza a II – a), iar 17 cazuri s-au înregistrat la copii vaccinați corespunzător vârstei.

Motivele nevaccinării:

- neînscrisi la medic de familie (3 cazuri);
- contraindicație medicală temporară (1 cazuri);
- neprezentare (13 cazuri);
- nu are vârsta de vaccinare (34 cazuri);
- refuz (4 cazuri);
- antecedente necunoscute (11 cazuri).

Marea majoritate a cazurilor sunt de etnie romă: Oradea – 13 cazuri (din care 1 suspiciuni), Tinca – 11 cazuri, Lupoiaia – 1 cazuri, Salonta – 4 cazuri (din care 1 suspiciuni), Sînmartin – 1 caz, Ciumeghiu – 2 cazuri, Ceișoara – 1 caz, Sîntandrei – 6 cazuri (din care 1 suspiciuni), Picleu – 1 caz, Gepiu – 8 cazuri (din care 2 suspiciuni), Sînoib – 3 cazuri, Lugas de Jos – 3 cazuri, Aleșd – 7 cazuri (din care 2 suspiciuni), Tileagd – 4 cazuri, Dobrești – 2 cazuri, Rontău – 2 cazuri, Boiu – 2 cazuri, Popești – 1 caz, Chistag – 1 caz, Tulca – 1 caz, Ineu de Criș – 2 cazuri (din care 2 suspiciuni), Batăr – 1 caz, Beznea – 2 cazuri, Girisul Negru – 1 caz, Ant – 1 caz (din care 1 suspiciuni), Bălaia – 1 caz (din care 1 suspiciuni), Corbești – 1 caz (din care 1 suspiciuni).

Distribuție pe grupe de vârstă:

Grupa de vârstă

Nr. de cazuri

0 – 1 an

34 cazuri

1 an

5 cazuri

2 ani

4 cazuri

3 ani

2 cazuri

4 ani

3 cazuri

5 – 9 ani

7 cazuri

10 – 14 ani

8 cazuri

15 – 19 ani

4 cazuri

20 – 24 ani

7 cazuri

25 – 34 ani

4 cazuri

35 – 44 ani

4 cazuri

45 – 55 ani

1 caz

Măsurile dispuse de DSP Bihor în vederea scăderii numărului de îmbolnăviri prin rujeolă:

- informarea spitalelor și structurilor de primire a urgențelor (UPU și CPU) privind localitățile în care există persoane cu rujeolă în vederea izolării corespunzătoare a cazurilor,
- informarea primăriilor din localitățile în care există cabinete de medici de familie cu o rată de vaccinare scăzută (de exemplu: Aleșd, Borod, Ciumeghiu, Lăzăreni, Marghita, Oșorhei, Tinca) în vederea creșterii adresării populației la cabinetele medicilor de familie pentru vaccinare;
- în luna februarie a.c. se efectuează estimarea acoperirii vaccinale pentru copiii născuți în anul 2013.

Anexat prezentului comunicat de presă este un pliant care explică importanța vaccinării în prevenirea rujeolei.

Director Executiv

Dr. Daniela Rahotă

RUJEOLA este o boală foarte contagioasă și gravă

Rujeola **RĂMÂNE UN PERICOL** în Regiunea OMS Europa

2017:
21315 cazuri

ȘTIAȚI CĂ...

2016:
5273 cazuri



Rujeola este **de 6 ORI** mai infecțioasă decât gripa.

1 DIN 5 CAZURI

Pot prezenta boli grave ori **complicații**, cum sunt otita, pneumonia, surditatea permanentă, encefalita sau chiar deces.



Rujeola se transmite rapid în comunitate și între comunități, dacă nu există **imunitate colectivă**.



Vaccinurile rujeolice sunt **sigure și eficiente**. Acestea sunt supuse unor testări riguroase și au un istoric foarte bun al siguranței după **50 de ani de când sunt în uz**.



Două doze de vaccin rujeolic oferă aproape **100% protecție** împotriva rujeolei.

POȚI STOPA RUJEOLA



la parte la
#vaccinareaEuropei



Săptămâna Europeană a Vaccinării

Prevenire Protecție Vaccinare

#Vaccinurile sunt benefice pentru protecția ta și a celor din jurul tău

www.euro.who.int/vaccines

© WHO/CISID data as of 2 February 2018



World Health Organization

REGIONAL OFFICE FOR Europe