

# ȚIGĂRILE OTRĂVESC OAMENII ȘI PLANETA

Renunțați la fumat pentru sănătatea voastră și a planetei!  
17 noiembrie 2022

Material adresat populației generale

## ȘTIAȚI CĂ TUTUNUL AFECTEAZĂ ÎNTREGUL MEDIU?



### Cultivarea tutunului

degradează solul, amenință biodiversitatea prin utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor, expune fermierii la substanțe chimice toxice și se soldează cu defrișări masive la nivel global.



**Prelucrarea tutunului** afectează mediul prin utilizarea de apă și energie, producerea de deșeuri și gaze cu efect de seră. Emisiile estimate produse în procesul de prelucrare a tutunului sunt egale cu emisiile a aproximativ **3 milioane de zboruri transatlantice**.

**Transportul frunzelor și produselor din tutun** contribuie semnificativ la poluarea aerului. Expunerea la aerul poluat poate crește riscul de infarct și accident vascular cerebral.



**Fumatul** are impact asupra sănătății celor care fumează, a celor din jurul lor și asupra mediului prin emisiile toxice și gazele cu efect de seră. Anual, fumul de țigară este responsabil de producerea a mii de tone de substanțe chimice cancerigene, alte toxine și gaze cu efect de seră.

**Aruncarea deșeurilor** de tutun conduce la acumularea de cantități substanțiale și scurgeri de substanțe toxice în mediu.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE  
PUBLICĂ BIHOR

# ȚIGĂRILE OTRĂVESC OAMENII ȘI PLANETA

17 noiembrie 2022


**Ai nevoie de consiliere pentru a  
renunța la fumat?**

Accesează: [www.stopfumat.eu](http://www.stopfumat.eu)

Apelează Telveverde gratuit: 0800878673

## ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN 17 NOIEMBRIE 2022

Material adresat populației generale



**Renunțați la fumat pentru sănătatea  
voastră și a planetei!**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE  
PUBLICĂ BIHOR



## TUTUNUL ȘI RISCUL ASOCIAT PENTRU SĂNĂTATE

### Stimularea stării de bine

Fumatul crează pe moment o stare de bine, dar frecvent produce dependență și simptome de sevraj ca anxietate, iritabilitate.

### Anxietate și iritabilitate

Apar în situația în care se pierde o pauză de țigară ca rezultat al scăderii concentrației de nicotină din sânge.

### Miros neplăcut al părului

Fumul de țigară se atașează de haine și păr.

### Afectarea dinților

Pete gălbui și maronii pe dinți, creșterea riscului de infecții și inflamații ale gingiilor

### Bronșite

Fumătorii au o rată mai ridicată a bronșitelor.

### Tuse persistentă

Lezarea căilor aeriene contribuie la tuse.

### Boli cardiace

Fumatul este unul dintre factorii dovediți care contribuie la creșterea riscului de boli cardiace.

### Colesterol ridicat

Fumatul reduce HDL-colesterolul (bun) și crește LDL-colesterolul (rău), colesterolul total și trigliceridele (lipidele din sânge).

### Sistemul imun

Fumatul reduce abilitatea sistemului imun de a lupta cu infecțiile. Fumătorii au infecții ale tractului respirator mai frecvente comparativ cu nefumătorii.

### Infertilitate

Atât bărbații cât și femeile care fumează au o probabilitate mai mare de a prezenta probleme de fertilitate.

### Disfuncție erectilă

Erecția necesită un flux sanguin adecvat, dar fumatul poate determina constricția vaselor de sânge îngreunând procesul.

### Complicații ale diabetului

Diabetul de tip II tinde să evolueze mai rapid la fumători deoarece fumatul crește rezistența la insulină. La diabetici care fumează crește riscul complicațiilor de tipul infarctului miocardic, probleme la ochi și renale.

### Cheaguri sanguine

Fumatul poate stimula formarea de cheaguri în corp care cresc riscul de afectare cardiacă, AVC, embolism pulmonar.

### Menopauză precoce

Femeile fumătoare au tendința de a intra mai precoce în menopauză comparativ cu nefumătoarele.

### Vedere slabă

Fumatul crește riscul de probleme oculare, glaucom, degenerescență maculară, cataractă.

### Afectarea gustului și mirosului

### Cancer pulmonar

Fumatul crește semnificativ riscul de cancer pulmonar. Conform CDC, cancerul pulmonar este cea mai obișnuită cauză de deces determinată de fumat.

### Vasoconstricție

Nicotina produce vasoconstricție care crește riscul de hipertensiune arterială, AVC și infarct.

### BPCO

Dezvoltarea bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) este mai frecventă la fumători. 8 din 10 cazuri sunt datorate fumatului.

### Reducerea apetitului

Fumatul reduce apetitul prin scăderea simțului gustativ.

### Colorarea galbenă a degetelor

Manipularea tutunului poate duce la pătarea în galben a degetelor.

### Cancer cervical

Riscul de cancer cervical este crescut la femeile fumătoare.

### Ridarea pielii

Substanțele din tutun pot determina îmbătrânirea prematură a pielii.

### Probleme cu sarcina și ale nou-născutului

Fumatul în timpul sarcinii poate să crească riscul de avort și de astm, infecții ale urechii la nou-născut. Poate determina riscul de depravare de oxigen pentru copil, probleme de creștere și dezvoltare și sindrom de moarte subită.

### Legătura cu cancerul

Căncerele în legătură cu fumatul se pot localiza în orice parte a corpului. Fumătorii au rate mai crescute de cancer al gurii, gâtului, vezicii urinare și rinichilor.

### Risc crescut de leucemie

## TUTUNUL ȘI RISCUL ASOCIAT PENTRU MEDIU

### 6 TRILIOANE DE ȚIGĂRI SUNT PRODUSE ANUAL, POLUÂND ȘI DEVASTÂND MEDIUL

ANUAL ...



**600 MILIOANE DE COPACI**  
sunt tăiați pentru fabricarea de țigări, ceea ce are ca rezultat defrișări pe scară largă și desertificări



**84 MILIOANE TONE DE CO<sub>2</sub>**  
din procesul de fabricare sunt emise în aer, echivalentul lansării în spațiu a 200.000 rachete



**22 TRILIOANE LITRI DE APĂ**  
sunt utilizați pentru producerea țigărilor, epuizând resurse prețioase de apă



**200.000 HECTARE DE TEREN**  
sunt defrișate anual pentru cultivarea tutunului – echivalentul a aprox. o treime din întreaga junglă amazoniană



**27,2 MILIOANE TONE DE RESURSE MATERIALE**  
sunt necesare pentru fabricarea țigărilor, epuizând resurse prețioase de combustibil fosil și metale



**62,2 PETAJOULI DE ENERGIE**  
sunt utilizați pentru fabricarea de țigări, generând o cantitate substanțială de emisii de carbon



**25 MILIOANE TONE CUB DE DEȘEURI**  
sunt generate în ciclul global al tutunului



**4,5 TRILIOANE MUCURI DE ȚIGARĂ**  
sunt aruncate în mediu, otrăvind viața marină, contaminând plajele și spațiile urbane



**7000 SUBSTANȚE CHIMICE**  
Sunt eliberate în mediu prin fumat, 70 dintre acestea recunoscute ca și cancerigene

# ȚIGĂRILE OTRĂVESC OAMENII ȘI PLANETA

Renunțați la fumat pentru sănătatea voastră și a planetei!

17 noiembrie 2022

Material adresat populației generale

## CONSUMUL DE TUTUN LA NIVEL MONDIAL

Tutunul ucide până la jumătate dintre utilizatorii săi.

Tutunul ucide peste **8 milioane** de oameni în fiecare an.

**Peste 7 milioane** dintre decese sunt rezultatul consumului direct de tutun, în timp ce aproximativ **1,2 milioane** sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la fumatul pasiv.

**Peste 80%** dintre cei 1,3 miliarde de consumatori de tutun din lume trăiesc în țări cu venituri mici și medii.

În 2020, **22,3%** din populația globală a consumat tutun.



**36,7%** dintre bărbați



**7,8%** dintre femei

## CONSUMUL DE TUTUN ÎN EUROPA

Aproximativ **186 milioane adulți** în Regiunea Europeană OMS consumă produse din tutun.


## CONSUMUL DE TUTUN ÎN ROMÂNIA

**30,7% (5,63 de milioane)** dintre adulții cu vârsta de minimum 15 ani (**40,4% bărbați** și **21,7% femei**) consumă curent o formă de tutun (fumat, tutun fără fum și produse cu tutun încălzit).

În România **3 din 10 adulți** consumă tutun (Studiul GATS 2018)



## IMPACTUL CICLULUI DE VIAȚĂ AL TUTUNULUI



**22 de miliarde de tone de apă** utilizate în producția globală de tutun - 3,7 litri de apă utilizată la fabricarea unei țigarete

**2 milioane de tone de deșeuri de ambalaje** – greutatea a 9433 trenuri de marfă

Copacii tăiați pentru a face loc tutunului, în creștere, reprezintă **5% din defrișările globale**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR

- WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking 2000–2025, second edition. Geneva: World Health Organization
- WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, *Offer Help to Quit Tobacco Use*, 2019. Geneva: World Health Organization; 2019
- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>, Key Facts, 24 May 2022
- <https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022>, Tobacco poisoning our planet
- <https://www.who.int/europe/multi-media/item/information-note-on-covid-19-and-tobacco>



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

## ANALIZA DE SITUAȚIE

**17 noiembrie 2022 - ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN**

«Țigările otrăvesc oamenii și planeta»

### CUPRINS:

|                                                                                                              | Pag.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Date statistice la nivel global privind impactul tutunului asupra mediului</b>                         | <b>2</b>  |
| <i>Fermele de tutun și sănătatea</i>                                                                         | 3         |
| <i>Utilizarea agrochimică</i>                                                                                | 3         |
| <i>Epuizarea resurselor de apă</i>                                                                           | 4         |
| <i>Defrișarea și degradarea terenurilor</i>                                                                  | 4         |
| <i>Emisiile de carbon</i>                                                                                    | 5         |
| <i>Deșeurile electronice din noile produse emergente</i>                                                     | 5         |
| <b>II. Date statistice la nivel global, european și național privind consumul de tutun</b>                   | <b>6</b>  |
| <i>Date statistice la nivel global</i>                                                                       | 6         |
| <i>Date statistice la nivel european</i>                                                                     | 9         |
| <i>Date statistice la nivel național</i>                                                                     | 10        |
| <b>III. Date din studii internaționale privind impactul fumatului asupra sănătății adulților și copiilor</b> | <b>11</b> |
| <b>IV. Analiza grupurilor populaționale</b>                                                                  | <b>13</b> |
| <b>V. Campanii naționale</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>V. Rezultatele obținute în urma administrării chestionarului KAP</b>                                      | <b>14</b> |





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

## ANALIZA DE SITUAȚIE

17 noiembrie 2022 - ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN

«Țigările otrăvesc oamenii și planeta»



Prin Hotărârea 1270/2002 a Guvernului României, cea de-a 3-a zi de joi a lunii noiembrie a fost declarată **“Ziua Națională fără Tutun”**, în temeiul art. 107 alin. (2) din Constituție și al art. 8 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Campania reprezintă o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul populației privind efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, în scopul de a preveni inițierea consumului, precum și pentru a descuraja utilizarea tutunului sub orice formă și a încuraja renunțarea la fumat.

### I. Date statistice la nivel global privind impactul tutunului asupra mediului

Tutunul dăunează sănătății în mod direct prin utilizare și fumat pasiv și indirect prin impactul negativ asupra mediului, care are loc în diferite etape, inclusiv în cultivare, fabricare, distribuție, utilizare și eliminarea deșeurilor rezultate. Fiecare dintre aceste etape are implicații negative pentru mediu, începând cu utilizarea resurselor prețioase precum apa, copacii și prin crearea de poluanți în procesul de fabricație. De asemenea, producția și consumul de tutun contribuie la încălzirea globală, eliberând anual în mediu 80



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

de milioane de tone de dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), echivalentul conducerii a 17 milioane de mașini pe benzină în fiecare an (1).

Implicațiile negative pentru sănătate ale consumului de tutun sunt bine cunoscute, incluzând riscul crescut de boli cardiovasculare, cancere și boli respiratorii, dar mai puțin discutate și cunoscute sunt efectele nocive asupra sănătății planetei. Cultivarea tutunului duce la distrugerea pădurilor, afectarea solului și epuizarea resurselor de apă, în timp ce în procesul de fabricație se produc o serie de deșeuri toxice. Mucurile de țigară și alte forme de deșeuri ale produselor din tutun otrăvesc râurile, oceanele și viața marină și contaminatează plajele (2). Impactul asupra mediului asociat producției și utilizării tutunului este augmentat de apariția noilor dispozitive electronice de fumat și de livrare de nicotină care conțin metale, materiale plastice și baterii clasificate ca deșeuri toxice periculoase.

### ***Fermele de tutun și sănătatea***

Fermierii care cultivă tutunul și familiile lor sunt expuși la numeroase riscuri pentru sănătate. Până la 25% dintre fermierii cultivatori de tutun (3) sunt afectați de boala tutunului verde (intoxicație cu nicotină), o boală cauzată de nicotina absorbită prin piele la manipularea frunzelor de tutun. Ei sunt expuși zilnic la „*praf de tutun*” și diferite pesticide chimice. Un fermier care plantează, cultivă și recoltează tutunul poate absorbi echivalentul în nicotină a 50 de țigări. Pe lângă expunerea lor directă, fermierii aduc adesea acasă pe corp, haine sau încălțăminte substanțe dăunătoare, ceea ce duce în mod secundar la expuneri nocive ale membrilor familiilor lor. Copiii sunt deosebit de vulnerabili, având în vedere greutatea lor corporală raportată la proporția de nicotină ce poate fi absorbită prin piele (4). Femeile însărcinate sunt afectate în mod disproporționat de efectele nocive ale culturii de tutun și se confruntă cu un risc mai mare de avort spontan (3). Din punct de vedere socio-economic fermierii sunt prinși într-un cerc vicios al datoriilor efectuate în achiziționarea de semințe și substanțe chimice, făcând fermierul incapabil să beneficieze pe deplin de piața profitabilă a tutunului (5).


### ***Utilizarea agrochimică***

Cultivarea tutunului necesită un consum mare de resurse și utilizarea intensivă a pesticidelor și îngrășămintelor, care contribuie la degradarea solului (6). Aceste substanțe chimice ajung în mediul acvatic având ca rezultat contaminarea lacurilor, râurilor și a apei potabile. Terenul folosit pentru

- 
1. Zafeiridou M, Hopkinson NS, Voulvoulis N. Cigarette smoking: an assessment of tobacco's global environmental footprint across its entire supply chain. *Environ Sci Technol*. 2018;52(15):8087–94
  2. Our world is being burned by tobacco: it's time to talk about it. In: STOP [website]. Bath: STOP; 2022 (<https://exposetobacco.org/campaigns/burned-by-tobacco>)
  3. Tobacco farming. In: Tobacco Tactics [website]. Bath: University of Bath; 2020 (<https://tobaccotactics.org/wiki/tobacco-farming>)
  4. Kulik MC, Bialous SA, Munthali S, Max W. Tobacco growing and the Sustainable Development Goals, Malawi. *Bull World Health Organ*. 2017;95(5):362–7.
  5. WHO, Tobacco: poisoning our planet, 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051287>
  6. Lecours N, Almeida GEG, Abdallah JM, Novotny TE et al. Environmental health impacts of tobacco farming: a review of the literature. *Tob Control*. 2012;21(2).



cultivarea tutunului are un potențial mai redus pentru creșterea altor culturi deoarece tutunul epuizează solul (7).



### ***Epuizarea resurselor de apă***

Epuizarea resurselor prețioase de apă este o altă consecință nefastă a producției de tutun. O singură țigară necesită utilizarea a circa 3,7 litri de apă pe parcursul ciclului său de producere, de la creștere/cultivare, producție, transport și utilizare, eliminare (1). În fiecare an, aproximativ 22 de miliarde de tone de apă sunt utilizate în producția de tutun la nivel global. Tutunul necesită de până la opt ori mai multă apă decât, de exemplu, roșiile sau cartofii. Pe de altă parte, o mare proporție de deșeuri din produsele de tutun, care constă în cea mai mare parte în mături de țigară, ajunge în apă, în primul rând prin sistemele de apă pluvială, infiltrații din gropile de gunoi sau aruncarea gunoierului direct în apă sau în zone din apropierea apei (de exemplu, plaje sau parcuri). Figura 1 ilustrează impactul tutunului asupra poluării apelor.

### ***Defrișarea și degradarea terenurilor***

Defrișarea, epuizarea solului și eroziunea reprezintă, de asemenea, o situație îngrijorătoare. Pentru a face loc pentru cultivarea tutunului, copacii trebuie tăiați și terenul defrișat, fiind nevoie de masa lemnoasă a aproximativ un copac pentru producția a 300 de țigări. Agricultură tutunului este responsabilă pentru aproximativ 5% din totalul defrișărilor. Aproximativ 200 000 de hectare de teren sunt autorizate pentru

7. Zhang Y, He X, Liang H, Zhao J, Zhang Y, Xu C et al. Long-term tobacco plantation induces soil acidification and soil base cation loss. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23(6):5442–50.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII




CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

agricultura tutunului în fiecare an (8). Comparativ cu altele activități agricole, precum cultivarea porumbului și chiar creșterea și pășunatul animalelor, cultivarea tutunului are un impact mult mai distructiv asupra ecosistemelor, terenurile agricole cultivate cu tutun fiind mai predispuse la deșertificare.

### **Emisiile de carbon**

Fabricarea și distribuția produselor din tutun sunt dăunătoare mediului în toate etapele ciclului de viață a tutunului ca urmare a utilizării pe scară largă a energiei, apei și a altor resurse (Figura 2). În general, aceste procese generează o cantitate substanțială de emisii de carbon, echivalentul a 3 milioane de zboruri transatlantice (9).

**FIG. 2 AMPRENTA ANUALĂ DE CARBON A INDUSTRIEI DE ȚIGĂRI**  
**Echivalentul a 84 milioane tone CO<sub>2</sub>**



Source: Zafeiridou M, Hopkinson NS, Voulvoulis N. Cigarette smoking: an assessment of tobacco's global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018.

### **Deșeurile electronice din noile produse emergente**

Daune suplimentare aduse mediului sunt cauzate de eliminarea improprie a deșeurilor electronice rezultate din sistemele de livrare de nicotină, cum ar fi țigările electronice și produse din tutun încălzit, care generează și ele emisii toxice și deșeuri. Efectele nocive asupra mediului produse de fabricarea acestor dispozitive, dar și eliminarea țigărilor electronice, cartușelor și bateriilor sunt puțin documentate (10). Majoritatea cartușelor din plastic pentru țigări electronice nu sunt reutilizabile sau reciclabile și

8. Tobacco control for sustainable development. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/255509>)

9. More than 100 reasons to quit tobacco. In: World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/news-room/spotlight/more-than-100-reasons-to-quit-tobacco>)

10. Chang H. Research gaps related to the environmental impacts of electronic cigarettes. Research gaps related to the environmental impacts of electronic cigarettes. Tob Control. 2014;23:ii54–ii58, [https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl\\_2/ii54](https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl_2/ii54)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

ajung în jgheaburi, străzi și căi navigabile (11). Aceste produse conțin materiale plastice, bobine metalice, atomizoare, baterii, cipuri de microcontrol și încărcătoare.


## II. Date statistice la nivel global, european si național privind consumul de tutun

### a. Date statistice la nivel global

Cauză principală de deces, boală și sărăcie, epidemia de tutun este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice cu care s-a confruntat lumea, tutunul omorând anual peste 8 milioane de persoane. Mai mult de 7 milioane din decese sunt rezultatul direct al consumului de tutun, în timp ce aproximativ 1,2 milioane sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la fumul de tutun ambiental – fumatul pasiv (1, 2). Tutunul este singurul produs consumat legal care poate ucide până la jumătate dintre cei care îl folosesc ca atare. Cu toate acestea, consumul de tutun este frecvent în întreaga lume datorită prețurilor relativ scăzute, a comercializării agresive și răspândite, a lipsei de conștientizare privind pericolele sale și a politicilor publice de control diverse și inconsistente (3). Costul total al fumatului (cheltuielile de sănătate și pierderile de productivitate) este de peste 1.400 miliarde de dolari, reprezentând echivalentul a 1,8% din produsul intern brut (PIB) anual al lumii. Aproape 40% din aceste costuri apar în țările în curs de dezvoltare, amplificând povara substanțială pe care o resimt aceste state (4, 5).

Deși prevalența fumatului la nivel global a scăzut (de la 22,7% în 2007 la 19,6% în 2019), numărul total de fumători rămâne ridicat datorită creșterii populației. La nivel global, cel puțin 940 de milioane de bărbați și 193 de milioane de femei cu vârsta de 15 ani sau mai mult erau fumători curenți în 2019.

Fig. 3 Țările cu cel mai mare număr de fumători



11. More than 100 reasons to quit tobacco. In: World Health Organization [website]. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/news-room/spotlight/more-than-100-reasons-to-quit-tobacco>)





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII




CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Peste 500 de milioane de fumători trăiesc în trei țări (Fig. 3). O treime dintre toți bărbații care fumează la nivel global trăiesc în China.

Peste 75% dintre bărbații care fumează zilnic trăiesc în țări cu un indice de dezvoltare umană (IDU) mediu sau ridicat, în timp ce mai mult de 53% dintre femeile care fumează zilnic trăiesc în țări cu IDU foarte ridicat (12). Tendința anterioară de scădere a prevalenței fumatului în majoritatea țărilor cu IDU foarte ridicat a stagnat în ultimii ani, iar prevalența fumatului a continuat să crească sau să rămână la niveluri ridicate în multe țări cu IDU mediu sau ridicat. Din 1990, consumul pe cap de locuitor a scăzut în toate regiunile OMS, dar în același timp, numărul fumătorilor a crescut semnificativ, ducând la un consum global mai mare. Prevalența fumatului la bărbați a crescut în aproximativ o treime din țările cu IDU mediu sau ridicat, în timp ce în aproape toate țările cu IDU foarte ridicat prevalența fie a scăzut, fie a rămas neschimbată. Pe de altă parte, prevalența fumatului la femei a crescut în mai mult de o treime din țările cu IDU ridicat și în aproximativ o cincime din țările cu IDU foarte ridicat (12).

**Fig. 4 Modificarea procentuală a consumului de țigări pe cap de locuitor și a numărului de fumători, 1990–2019, pe regiuni OMS**



Source: GBD, 2019

THE TOBACCO ATLAS

În ceea ce privește tendința consumului de tutun (Figura 4) se observă că în timp ce consumul pe cap de locuitor a scăzut în toate regiunile, numărul fumătorilor a crescut semnificativ (în contextul creșterii populației) în patru din șase regiuni Africa, Regiunea Mediteraneană, Asia de Sud-Est și Regiunea Pacificului de Vest (Tobacco Atlas). Figura 5 ilustrează prevalența consumului de țigări la nivel mondial.

<sup>12</sup> The Tobacco Atlas 7th Edition 2022, <https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence/>

Fig. 5 Consumul de țigări la nivel mondial





Fig. 6 Ponderea creșterii prevalenței fumatului în raport cu indicele de dezvoltare



Source: GBD, 2019

THE TOBACCO ATLAS

În ceea ce privește ponderea creșterii prevalenței fumatului în raport cu indicele de dezvoltare umană (IDU)(Fig. 6), se observă creșteri semnificative ale prevalenței la ambele sexe în țările cu indice de dezvoltare scăzut, mediu și ridicat. În schimb, în țările cu IDU foarte ridicat, în timp ce prevalența fumatului la bărbați a crescut cu doar 3,1%, la femei s-a înregistrat o creștere semnificativă, una din 5 femei fiind fumătoare (20,3%).



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

### *b. Date statistice la nivel european*

Prevalența consumului de tutun în Regiunea Europeană a OMS, a fost în 2019 de 18,4% (13) pentru populația de 15 ani și peste, indicatorul fiind mai mare în cazul sexului masculin (6). De fapt, 12,6% din populația UE a consumat mai puțin de 20 de țigări pe zi, în timp ce 5,9% au consumat 20 sau mai multe țigări zilnic. În statele membre UE, țările cu cea mai mare pondere de fumători zilnici de țigări au fost Bulgaria (28,7%), Grecia (23,6%), Letonia (22,1%), Germania (21,9%) și Croația (21,8%). În schimb, țările cu cele mai mici cote de fumători zilnici au fost Suedia (6,4%), Finlanda (9,9%), Luxemburg (10,5%), Portugalia (11,5%) și Danemarca (11,7%). Proporția fumătorilor care consumau 20 de țigări sau mai mult pe zi a variat între 1,0% în Suedia și 12,9% în Bulgaria. În același timp, ponderea fumătorilor care au consumat mai puțin de 20 de țigări a variat între 5,3% în Suedia și 15,8% în Bulgaria. În 2019, în populația masculină erau mai mulți fumători decât în populația feminină: 22,3% dintre bărbații cu vârsta de 15 ani și peste erau fumători zilnici de țigări, comparativ cu 14,8% dintre femei. La nivel de țară, proporția bărbaților care au fumat zilnic a variat de la un nivel scăzut de 5,9% în Suedia până la un nivel ridicat de 37,6% în Bulgaria. Pentru femei, aceasta a variat între 6,8% în Suedia și 20,7% în Bulgaria. În toate statele membre ale UE, proporția fumătorilor zilnici de țigări a fost mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, cu excepția Suediei și Danemarcei. În Suedia, ponderea bărbaților care au fumat zilnic a fost cu 0,9 puncte procentuale mai mică decât ponderea femeilor care fumează zilnic, în timp ce în Danemarca proporția bărbaților care fumau zilnic a fost cu 0,1 puncte procentuale mai mică decât ponderea femeilor care fumează zilnic (12). În Tabelul 1 este prezentată ponderea îmbolnăvirilor și ratele de mortalitate atribuite fumatului.

**Tabelul 1. Ponderea îmbolnăvirilor și rate de mortalitate atribuite fumatului în Regiunea Europeană OMS**

|                                    | Morbiditate (%) |          | Mortalitate* (rate) |              |
|------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
|                                    | Bărbați         | Femei    | Bărbați             | Femei        |
| Boli cronice netransmisibile (NCD) | 28              | 7        |                     |              |
| Boli cardiovasculare               | 25              | 6        | 396,4               | 253,8        |
| Accident vascular cerebral         | 21              | 5        | 89,4                | 67,8         |
| Infarct miocardic acut             | 26              | 6        | 193,5               | 107          |
| Alte boli cardiovasculare          | 27              | 9        |                     |              |
| Boli maligne                       | 41              | 10       | 201,8               | 11,58        |
| Cancer bronhopulmonar              | 92              | 62       | 53,3                | 15,5         |
| Boli respiratorii                  | 63              | 37       | 67,5                | 32,7         |
| BPOC                               | 79              | 54       | 39,8                | 16,9         |
| Boli transmisibile                 | 23              | 12       | 16,6                | 8,5          |
| Tuberculoza                        | 30              | 5        | 5,4                 | 1,4          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>25</b>       | <b>7</b> | <b>932,5</b>        | <b>553,6</b> |

\* Mortalitate standardizată cu vârsta, număr de decese la 100000 de locuitori. Sursa: World Health Organization. Regional Office for Europe  
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/346817>

<sup>13</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211112-1>



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, Biroul Regional Europa (Tabelul 1), proporția deceselor atribuibile fumatului, în cazul bolilor prezentate anterior, arată cât de mult din proporția pentru fiecare boală ar putea fi redusă dacă consumul de tutun ar fi eliminat


În cazul BOLILOR CRONICE NETRANSMISIBILE (BNT), proporția deceselor atribuibile consumului de tutun a fost de 18%, ceea ce înseamnă că, aproape unul din cinci decese premature cu BNT ar putea fi evitat dacă consumul de tutun ar fi eliminat cu totul din regiune.

În cazul BNT, proporția deceselor atribuibile tutunului a fost de patru ori mai mare pentru bărbați (28%) decât pentru femei (7%). Diferențele de gen reprezintă un aspect important de care specialiștii trebuie să țină seama atunci când se are în vedere planificarea strategiilor de prevenție și control

### c. Date statistice la nivel național

**Eurostat 2019** (13) situează România pe locul 14 în Uniunea Europeană (Fig.7) în ceea ce privește proporția celor care fumează zilnic. Deși fumează zilnic o proporție mai mică decât în cazul bulgarilor (28,7%), grecilor (23,5%), sau germanilor (21,9%), românii fumează zilnic într-o proporție considerabil mai mare decât suedezi (6,4%) și finlandezi (9,9%).

**Fig. 7 Proporția celor care fumează zilnic în raport cu nivelul de consum**



ec.europa.eu/eurostat

**Conform Studiului Global privind Tutunul la Adulți (GATS) 2018**, în România, în 2018, 30,7% (5,63 de milioane) dintre adulții cu vârsta de minimum 15 ani (40,4% bărbați și 21,7% femei) au consumat curent (zilnic sau mai puțin frecvent decât zilnic) tutun sub orice formă [pentru fumat, tutun fără fum și produse cu tutun încălzit (11,12)]. Per total, 30.2% (5.6 milioane, 39.2% dintre bărbați și 21.5% dintre femei) de adulți au fumat tutun în mod curent. O treime din fumătorii români (33,5%) au fost adulți tineri, din grupa de vârstă 15-24 de ani. 5 milioane de adulți s-au declarat fumători curenți zilnic (3,2 milioane de bărbați și 1,8 milioane de femei). Dintre fumătorii curenți zilnic, 71.5% fumează în primele 30 de minute de la trezire. Vârsta medie de inițiere a consumului de tutun, între persoanele în vârstă de 15-34 ani, care au fost sau sunt fumători curenți zilnic a fost 17,9 ani (17,7 ani în rândul bărbaților și 18,3 ani în rândul femeilor).





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

În general, 30,0% (5.5 milioane) dintre adulți s-au declarat fumători curenți de țigări (39,5% dintre bărbați și 21,2% dintre femei). Aceștia consumă în medie 16.5 țigări pe zi (bărbații 18,1, femeile 13,7). Mai mult de patru din zece români în vârstă de cel puțin 15 ani au fumat 20 sau mai multe țigări pe zi.

30,1% dintre adulții români în vârstă de 15 ani sau mai mult, au auzit vreodată de produse cu tutun încălzit, 4,3% dintre adulți au consumat vreodată produse cu tutun încălzit, iar 1,3% au fost consumatori curenți. Între adulții care au consumat măcar o dată produse din tutun încălzit, vârsta medie de inițiere a fost de 29,6 ani.

Cele trei motive principale pentru consumul produselor cu tutun încălzit (în rândul celor care au consumat măcar o dată produse cu tutun încălzit) au fost: "Pot fi consumate în momentele și în locurile în care fumatul de tutun nu este permis" (79,0%), "Pentru că îmi place" (67,9%), și "Sunt mai puțin dăunătoare decât fumatul" (62,1%).

### III. Date din studii internaționale privind impactul fumatului asupra sănătății adulților și copiilor

Consumul de tutun, indiferent dacă este vorba de tutun de fumat sau fără fum, este asociat cu o povară umană și economică substanțială. Fumatul este asociat cu risc crescut de boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, hipertensiune arterială și alte efecte pe sănătate (14,15). Cheltuielile de îngrijire a sănătății care pot fi atribuite fumatului s-au ridicat la 422 miliarde USD în 2012, sau 5,7% a cheltuielilor globale pentru sănătate (16). Fumatul în locuri publice interioare și locuri de muncă, case, contribuie la apariția substanțelor toxice în aerul respirat care pot provoca boli la nefumători. Peste 7000 de substanțe chimice au au fost identificate în fumul de tutun și se știe că cel puțin 70 provoacă cancer la oameni și animale (17).

Fumatul crește riscul de îmbolnăvire atât la adulți cât și la copii, dar comunicarea magnitudinii acestor efecte într-o manieră științifică accesibilă și utilizabilă de către public și factorii de decizie politică lasă încă de dorit.

Cele mai multe meta-analize privesc impactul fumatului asupra sănătății prin apariția cancerului pulmonar și al bolilor respiratorii. Una dintre acestea, a inclus 216 articole și a arătat că în rândul fumătorilor adulți au fost confirmate riscuri substanțiale pentru cancerul pulmonar (raportul de risc (RR), 10,92; 95% CI, 8,28-14,40, 34 de studii), bronhopneumopatia obstructivă cronică - BPOC (RR 4,01; 95% CI, 3,18-5,05; 22 studii) și astm (RR, 1,61; 95% CI, 1,07-2,42; opt studii). De asemenea, expunerea la fumatul pasiv a crescut semnificativ riscul de cancer pulmonar la nefumătorii adulți, precum și riscul de astm bronșic, infecții ale căilor respiratorii inferioare și funcție pulmonară redusă la copii. Totodată, fumatul a crescut semnificativ riscul de apnee în somn și exacerbări ale astmului la populațiile adulte și la gravide, iar atât fumatul activ cât și cel pasiv au crescut riscul de tuberculoză (15).

14. Kuper H, Adami H-O, Boffetta P. Tobacco use, cancer causation and public health impact. J Intern Med. 2002;251(6):455–66

15. Mitchell BE, Sobel HL, Alexander MH. The adverse health effects of tobacco and tobacco-related products. Prim Care. 1999;26(3):463–98

16. Goodchild M, Nargis N, Tursan d'Espaignet E. Global economic cost of smoking-attributable diseases. Tob Control. 2018;27(1):58–64.

17. Environmental tobacco smoke (ETS): general information and health effects. In: Canadian Centre for Occupational Health and Safety [website]. Hamilton, ON: Canadian Centre for Occupational Health and Safety; 2022 ([https://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/ets\\_health.html](https://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/ets_health.html))



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Pe de altă parte, odată cu creșterea rapidă a utilizării sistemelor electronice de livrare a nicotinei (Electronic Nicotine Delivery Systems-ENDS), precum țigăretele electronice (e-țigărete), continuă controversa privind efectele expunerii utilizatorilor și non-utilizatorilor la aerosoli și alte componente ale acestui tip de produs. Astfel, o analiză ce a cuprins 44 de articole privind ENDS, a arătat că aerosolii de la acest dispozitiv conțin de obicei nicotină, propilenă, glicol, glicerol, arome dar și alte chimicale. Aerosolizate, propilenglicolul și glicerolul produc iritații la nivelul gurii și al gâtului, precum și tuse uscată. Nu au fost identificate efecte ale inhalării aromelor. Datele privind efectele pe termen scurt asupra sănătății sunt limitate și nu există informații privind efectele pe termen lung. Expunerea la aerosoli poate fi asociată cu afectarea funcției respiratorii, iar nivelurile de cotinină serică sunt similare cu cele ale fumătorilor de țigări clasice. Concentrațiile mari de nicotină ale unor produse măresc riscurile de expunere pasivă pentru nefumători, în special pentru copii. Pericolele expunerii la aerosolii țigărilor electronice (fumatul pasiv specific) și ale fumatului terțiar (asociat impregnării obiectelor înconjurătoare cu particule din fumul de tutun) nu au fost evaluate. Dovezile științifice privind efectele ENDS asupra sănătății sunt limitate. În timp ce aerosolii țigărilor electronice pot conține mai puține substanțe toxice decât fumul de țigară clasică, studiile care evaluează impactul ENDS asupra sănătății sunt neconcludente. Unele dovezi sugerează că utilizarea acestor dispozitive poate facilita renunțarea la fumat, dar lipsesc datele definitive. Nicio țigară electronică nu a fost aprobată de Federal Drug Administration (FDA) ca alternativă pentru renunțarea la fumat. Există preocupări cu privire la mediu și aspecte legate de expunerea non-utilizatorilor (16).

Cu toate acestea, din luna iulie 2019 în SUA evoluează o epidemie de pneumonită chimică asociată consumului de țigări electronice care, la 5 noiembrie 2019, înregistra 2051 de cazuri în 48 din cele 50 de state SUA, cu 39 de decese din 24 de state (17).

Sintezele internaționale au confirmat că segmentul de populație cel mai vulnerabil la expunerea la fumul de tutun îl reprezintă copiii, în special în primii ani de viață, aceștia prezentând riscuri crescute pentru boli ale tractului respirator superior și inferior. Peste 40 de studii au demonstrat riscuri crescute pentru boala tractului respirator inferior (de exemplu bronșită, bronșiolită, pneumonie); aceste afecțiuni au fost legate în principal de fumatul părinților, fumatul matern fiind mai dăunător decât fumatul patern cu o creștere corespunzătoare a riscului de 1,7 ori (IC 95% = 1,6-1,9), respectiv de 1,3 ori (95% IC = 1.2-1.4) (18).

### ***Mecanismul de acțiune (inducerea dependenței de tutun)***

Conform OMS o persoană este considerată dependentă de o substanță atunci când aceasta are antecedente de consum cronic, cu următoarele caracteristici: abuz de substanță, continuarea administrării substanței în ciuda efectelor negative percepute, toleranță mare la substanță și manifestarea simptomelor de sevraj la încercarea de a înceta consumul. Nicotina inhalată ajunge în circulația arterială a sângelui din creier, prin plămâni, în șapte – zece secunde. Aceasta se fixează la nivelul receptorilor acetilcolinici specifici (în principal receptorii acetilcolinici nicotinici  $\alpha 4 \beta 2$ ) din aria nucleului accumbens, care stimulează eliberarea de neurotransmițători, precum dopamina și noradrenalina, fenomen care este perceput de către fumător ca o senzație de plăcere. Această senzație reprezintă de fapt înlăturarea simptomelor precoce de sevraj, pe măsură ce nivelurile de nicotină cresc, în paralel cu stimularea receptorilor nicotinici. Principala

<sup>18</sup> International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (FTS) and Child Health. WHO/NCD/TFI, 1999, Geneva: [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65930/WHO\\_NCD\\_TFI\\_99.10.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65930/WHO_NCD_TFI_99.10.pdf?sequence=1&isAllowed=y)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

caracteristică a dependenței de nicotină este dorința de a resimți efectele farmacologice ale nicotinei și de a evita posibilele fenomene de sevraj și asocierile lor condiționate, pozitive (nicotina produce o stimulare psihoactivă) sau negative (disconfortul generat de absența nicotinei). Consumul unei țigări scade pe moment dorința de a fuma, dar provoacă o desensitivizare a receptorilor nicotinici și totodată creșterea numărului acestora, precipitând nevoia pentru următoarea țigară. Această stimulare continuă cauzată de consumul de tutun conduce la un consum cronic. În cursul perioadei de inițiere a dependenței tabagice, fumătorul va trebui să-și crească cantitatea de nicotină administrată pentru a-și reinduce aceleași senzații intense. După perioada inițială de adaptare, el/ea va avea nevoie de doza sa individuală de nicotină care să-i asigure o stare neutră și să prevină instalarea fenomenelor de sevraj. Această adaptare morfologică care se petrece în sistemul nervos central corespunde fazei de dezvoltare a dependenței fizice (19).

#### ***IV. Analiza grupurilor populaționale***

Campania ZNT este adresată practic, întregii populații a României, dar și unor instituții foarte importante, unele dintre acestea cu putere de decizie. Parlamentul României, Ministerul Sănătății, decidenți locali din sănătatea publică, autorități publice locale/județene, ONG-uri cu profil pe sănătate, mass-media centrală și locală.

În sfera profesioniștilor sănătății: tuturor furnizorilor de servicii medicale și, în special, medicilor de familie.

În sfera populației: fumătorilor de toate vârstele, populației generale și, în mod deosebit copiilor și adolescenților. Abordarea tinerilor fumători este o problemă delicată, care trebuie să țină cont de specificul transformărilor ce caracterizează această vârstă, dar și de structura personalității fiecărui tânăr.

Mai multi factori cresc riscurile de inițiere a fumatului la tineri: curiozitatea naturală a adolescenților, opinia prietenilor, atitudini și comportamente familiale permissive față de consumul de tutun, disponibilitatea produselor din tutun, nevoia de noi experiențe și emoții, insecuritatea, eșecul școlar, etc. Tinerii sunt, din datele recente privind consumul de tutun grupa populațională cu cea mai mare creștere a prevalenței și, împreună cu populația de sex feminin de toate vârstele, reprezintă o țintă pentru industria tutunului.

---

<sup>19</sup> Ghidul ensp pentru tratamentul dependenței de tutun, <http://elearning-ensp.eu/assets/Romanian%20version.pdf>



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

## V. Campanii naționale

Campaniile organizate în ultimii ani și-au propus să conștientizeze anual populația cu privire la efectele nocive ale tutunului și în același timp să încurajeze promovarea unui stil de viață sănătos.

| SLOGANUL CAMPANIEI                                                                    | Anul |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>„Fără tutun, pentru o viață mai lungă și sănătoasă !”</i>                          | 2010 |
| <i>„Spune da VIEȚII! Spune NU tutunului!”</i>                                         | 2011 |
| <i>„Câștigă independența față de fumat!”</i>                                          | 2012 |
| <i>„Eu am reușit. Alege să nu fumezi!”</i>                                            | 2013 |
| <i>„Alege să fii sănătos! Alege să nu fumezi!”</i>                                    | 2014 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea!”</i>                         | 2015 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea”</i>                          | 2016 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea”</i>                          | 2017 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea”</i>                          | 2018 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea”</i>                          | 2019 |
| <i>„Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea”</i>                          | 2020 |
| <i>„Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare? ”</i> | 2021 |





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

## VI. Rezultatele obținute în urma administrării chestionarului KAP

### Caracteristici socio-demografice

La chestionarul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și pecepțiilor cu privire la fumat, în special țigări electronice și produse cu tutun încălzit, au răspuns un număr de 1863 de persoane, 77,7% femei (Figura 8), mai mult de jumătate din mediu urban (56.3%) (Figura 9), cu vârsta cuprinsă între 36 și 60 de ani (57,2%) (Figura 10), și mai mult de două treimi cu studii liceale (33.3%) sau superioare (34.1%) absolvite (Figura 11).

Genul dumneavoastră:  
1.863 de răspunsuri




Figura 8. Distribuția respondenților în funcție de gen

Mediul de rezidență  
1.864 de răspunsuri




Figura 9. Distribuția respondenților în funcție de mediul de rezidență



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Vârsta dumneavoastră:

1.864 de răspunsuri




Figura 10. Distribuția respondenților în funcție de vârstă

Ultimele studii absolvite:

1.864 de răspunsuri




Figura 11. Distribuția respondenților în funcție de nivelul ultimelor studii absolvite



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

## Cunoștințe și opinii legate de impactul tutunului asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător

Considerați că utilizarea produselor cu tutun afectează sănătatea oamenilor?

1.863 de răspunsuri




Figura 12. Opiniile respondenților cu privire la impactul tutunului asupra sănătății oamenilor

Care sunt cele mai importante efecte negative ale fumatului asupra sănătății?

1.802 răspunsuri




Figura 13. Cunoștințele respondenților cu privire la efectele negative ale fumatului asupra sănătății oamenilor

Vasta majoritate a respondenților (96.5%) este de părere că fumatul afectează sănătatea oamenilor. Dintre aceștia, cei mai mulți (87.7%) recunosc efectele negative asupra aparatului respirator, urmate de cancer (78.7%) și afecțiunile inimii și vaselor de sânge (77%).



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Considerați că industria tutunului afectează în mod negativ mediul înconjurător?

1.868 de răspunsuri




Figura 14. Opiniile respondenților cu privire la impactul negativ al tutunului asupra mediului înconjurător

Care sunt cele mai importante efecte negative ale industriei tutunului asupra mediului înconjurător?

1.642 de răspunsuri




Figura 15. Cunoștințele respondenților cu privire la efectele negative ale fumatului asupra mediului înconjurător

Marea majoritate (87.9%) a respondenților consideră că industria tutunului afectează în mod negativ mediul înconjurător. Dintre aceștia, mai mult de jumătate (61.5%) indică generarea de emisii de carbon drept cel mai important efect negativ, urmat de contaminarea apelor cu pesticide (35.5%), "epuizarea" solului pe care cresc culturile de tutun (28.3%) și defrișarea și degradarea terenurilor pentru plantarea tutunului.





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

### Atitudini cu privire la impactul informației (legate de impactul negativ al tutunului asupra oamenilor și mediului) asupra renunțării la fumat

Sunteți fumătoare/fumător?

1.868 de răspunsuri




Figura 16. Distribuția respondenților în funcție de statutul de fumător-nefumător

Ați încercat vreodată să renunțați la fumat?

443 de răspunsuri




Figura 17. Distribuția respondenților fumători care au încercat să se lase de fumat

Mai mult de trei sferturi dintre respondenți (76.3%) declară că sunt fumători (Figura 16). Dintre aceștia, 68.4% declară că au încercat să se lase de fumat (Figura 17).



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



CENTRUL REGIONAL DE  
SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Considerați că mai multe informații cu privire la impactul negativ al fumatului asupra organismului v-ar putea ajuta să renunțați la fumat?

443 de răspunsuri




Figura 18. Opiniile respondenților fumători cu privire la influența informației cu privire la impactul negativ al fumatului asupra organismului în renunțarea la fumat

Considerați că mai multe informații cu privire la impactul negativ al fumatului asupra mediului înconjurător v-ar putea ajuta să renunțați la fumat?

443 de răspunsuri




Figura 19. Opiniile respondenților fumători cu privire la influența informației cu privire la impactul negativ al fumatului asupra mediului în renunțarea la fumat

În ceea ce privește impactul informației asupra comportamentului legat de fumat, mai mult de jumătate (53.7%) dintre respondenții fumători au declarat că informațiile privitoare la impactul negativ al fumatului asupra organismului i-ar putea ajuta să renunțe la fumat (Figura 18). De asemenea, 61.4% dintre respondenți au declarat că informațiile privitoare la impactul negativ al fumatului asupra mediului înconjurător i-ar putea ajuta să renunțe la fumat (Figura 19).